

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[軟部肉腫]					
ADM単剤	ドキソルビシン	30mg/m ²	30分	day1.2	21
Eribulin	ハラヴェン	1.4mg/m ²	5分 (全開)	day1.8	21
IFO+ADM	イホマイド	2000mg/m ²	4時間	day2-6	21
	ドキソルビシン	30mg/m ²	30分	day2.3	
Trabectedin	ヨンデリス	1.2mg/m ²	24時間	day1	21
[原発不明がん]					
CBDCA+PTX	カルボプラチン	AUC=6	2時間	day1	21
	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	day1	
[悪性リンパ腫]					
CHASE-R	リツキシマブ	375mg/m ²	添付文書参照	day1	21
	エンドキサン	1200mg/m ²	2時間	day2	
	キロサイド	2000mg/m ²	3時間	day2-4	
	エトポシド	100mg/m ²	2時間	day2-4	
R-MPV	リツキシマブ	375mg/m ²	添付文書参照	day1	14
	メソトレキセート	3500mg/m ²	2時間	day2	
	オンコピン	1.4mg/m ²	15分	day2	
	プロカルバジン	100mg/m ²	1日2~3回	day1-7	
	(プロカルバジンは奇数コースのみ)				
HD-AraC (R-MPV及び放射線治療後の地固め療法として)	キロサイド	3000mg/m ²	3時間	day1.2	28