

| レジメン | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1クール(日) |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 3wDOC | ドセタキセル | 60mg/m ² | 1時間 | day1 | 21 |
| 3wDOC+HER | ドセタキセル ハーセプチン | 60mg/m ² 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg | 1時間 初回90分 2回目以降30分 | day1 day1.8.15 | 21 |
| 3wDOC+HER (HER3週毎) | ドセタキセル ハーセプチン | 60mg/m ² 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg | 1時間 初回90分 2回目以降30分 | day1 day1 | 21 |
| 3wHER | ハーセプチン | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg | 初回90分 2回目以降30分 | day1 | 21 |
| 3w PAC+Cap | パクリタキセル ゼローダ | 175mg/m ² 1650mg/m ² | 1時間 1日2回 内服 | day1 day1-14 | 21 |
| Abraxane | アブラキサン | 260mg/m ² | 30分 | day1 | 21 |
| abraxane+HER | アブラキサン ハーセプチン | 260mg/m ² 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg | 30分 初回90分 2回目以降30分 | day1 day1 | 21 |
| AC | ドキシソルピシン エンドキサン | 60mg/m ² 600mg/m ² | 15分 1時間 | day1 day1 | 21 |
| BV+PAC | アバスチン | 10mg/kg | 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 | day1.15 | 28 |
| CAF | パクリタキセル エンドキサン ドキシソルピシン 5-FU | 90mg/m ² 500mg/m ² 50mg/m ² 500mg/m ² | 1時間 15分 ゆっくり静注 | day1.8.15 day1 day1.8 | 21 |
| Cap+3wDOC | ゼローダ ドセタキセル | 2500mg/m ² 75mg/m ² | 1日2回 内服 1時間 | day1-14 day1 | 21 |
| CEF | エンドキサン エピルピシン 5-FU | 100mg/日 50mg/m ² 500mg/m ² | 1日2回 内服 ゆっくり静注 2時間 | day1-14 day1.8 day1.8 | 28 |
| CMF | エンドキサン メソトレキセート 5-FU | 100mg/日 40mg/m ² 600mg/m ² | 1日2回 内服 30分 全開 | day1-14 day1.8 day1.8 | 28 |
| EC/EC(90)/EC(75) | エピルピシン エンドキサン | 100/90/75(mg/m ²) 600mg/m ² | 15分 1時間 | day1 day1 | 21 |
| ET | エピルピシン パクリタキセル | 60mg/m ² 60mg/m ² | 15分 1時間 | day1 day1 | 21 |
| FEC100/FEC75/FEC60 | 5-FU エピルピシン エンドキサン | 500mg/m ² 100/75/60(mg/m ²) 500mg/m ² | 15分 15分 1時間 | day1 day1 day1 | 21 |
| GEM単剤療法 | ゲムシタピン | 1250mg/m ² | 30分 | day1.8 | 21 |
| GEM単剤療法(1投1休) | ゲムシタピン | 1250mg/m ² | 30分 | day1 | 14 |
| Halaven | ハラヴェン | 1.4mg/m ² | 5分 | day1.8 | 21 |
| Halaven+HER | ハラヴェン ハーセプチン | 1.4mg/m ² 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg | 5分 初回90分 2回目以降30分 | day1.8 day1 | 21 |

| レジメン | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1クール (日) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| IRIS(3週1コース) | カンプト エスワンタイホウ | 100mg/m ² | 90分 | day1 | 21 |
| | | 体表面積に応じた量 | 1日2回 内服 | day1-14 | |
| | | 1.25m ² 未満 80mg/日 | | | |
| | | 1.25以上1.5m ² 未満 100mg/日 | | | |
| | | 1.5m ² 以上 120mg/日 | | | |
| MMC+MTX (6コースまで) | マイトマイシン メソトレキセート | 8mg/m ² | 5分 | day1 | 28 |
| | | 60mg/m ² | 30分 | day1.15 | |
| PAC+GEM | パクリタキセル ゲムシタビン | 175mg/m ² | 3時間 | day1 | 21 |
| | | 1000mg/m ² | 30分 | day1.8 | |
| PAC+HER | パクリタキセル ハーセプチン | 80mg/m ² | 1時間 | day1 | 7 |
| | | 初回4mg/kg | 初回90分 | day1 | |
| | | 2回目以降2mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| PAC+HER (4週1コース) | パクリタキセル ハーセプチン | 80mg/m ² | 1時間 | day1.8.15 | 28 |
| | | 初回4mg/kg | 初回90分 | day1.8.15.22 | |
| | | 2回目以降2mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| PER+HER+DOC | パージェタ | 初回840mg | 1時間 | day1 | 21 |
| | | 2回目以降420mg | 2回目以降30分 | | |
| | ハーセプチン | 初回8mg/kg | 初回90分 | day1 | |
| | | 2回目以降6mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 1時間 | day1 | | |
| | ドセタキセル | 70mg/m ² | 1時間 | day1 | 21 |
| エンドキサン | | 600mg/m ² | 1時間 | day1 | |
| Vinorelbine | ナベルピン | 25mg/m ² | 10分 | day1.8 | 21 |
| Vinorelbine+PAC | ナベルピン パクリタキセル | 30mg/m ² | 10分 | day1 | 21 |
| | | 135mg/m ² | 1時間 | day1 | |
| VNR+HER | ナベルピン ハーセプチン | 25mg/m ² | 10分 | day1.8 | 21 |
| | | 初回4mg/kg | 初回90分 | day1.8.15 | |
| | | 2回目以降2mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| Weekly DOC | ドセタキセル | 20mg/m ² | 1時間 | day1.8.15 | 28 |
| Weekly DOC+HER | ドセタキセル ハーセプチン | 20mg/m ² | 1時間 | day1.8.15 | 28 |
| | | 初回4mg/kg | 初回90分 | day1.8.15.22 | |
| | | 2回目以降2mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| Weekly HER | ハーセプチン | 初回4mg/kg | 初回90分 | day1 | 7 |
| | | 2回目以降2mg/kg | 2回目以降30分 | | |
| Weekly PAC | パクリタキセル | 80mg/m ² | 1時間 | day1 | 7 |
| カドサイラ | カドサイラ | 3.6mg/kg | 初回90分 | day1 | 21 |
| | | | 2回目以降30分 | | |